



INFORMATIVO IMPORTANTE NOVA VACINA: BEXSERO (Anti-meningocócica B)

Esta vacina estará no mercado a partir da 1ª quinzena de maio de 2015.

Programas modelos propostos para aplicação:

- 2º mês, 4º mês, 6º mês e 12º mês

ou

- 3º mês, 5º mês, 7º mês e 13º mês.

Se a criança tiver mais do que 6 meses de idade, isto é, entre 6 meses e 1 ano:

- fazer primeira dose entre 6º e 8º mês e só mais uma dose 6 meses após.
- à partir de 1 ano, programar 2 doses, havendo intervalo entre as mesmas de 1 a 6 meses.
- este é projetado para qualquer faixa etária na Europa, enquanto que a Anvisa por enquanto só valida até 50 anos de idade.

Lembre-se que sempre proponho um mínimo de 15 dias de intervalo entre vacinas (não recomendo concomitância de vacina).

A vacina anti-meningocócica ACWY poderá ser feita à partir do 1º ano, portanto todos deverão rever sua imunização complementar.

Enquanto temos a oportunidade de proteger nossos filhos contra graves doenças a população carente continua excluída por limites político-econômicos, sugiro que todos façamos movimentos sociais para que essas vacinas façam parte do programa nacional de imunização.

“Direitos Iguais Para Todos”

Prof. Dr. Zan Mustacchi
Diretor Clínico do CEPEC-SP